

Sikavan rokotusohje

Alla oleva Sikavan rokotusohje on pääosin tehty vuonna 2011. Ohje päivitetään vuoden 2023 aikana.

Emakkosikalassa tulee huolehtia sisäloislääkityksistä sekä parvo- ja sikaruusurokotuksista. Emakot lääkitään sisäloisten varalta ennen porsimista, porsaat n. 7 viikon iässä.

Emakot rokotetaan sikaruusua vastaan kahdesti vuodessa.

Välitykseen myytävät porsaat rokotetaan cirkoa vastaan. Ensikot ja emakot tarvittaessa.

Parvorokotukset annetaan ensikoille kahdesti aikaisintaan puolen vuoden iässä, jatkossa emakot rokotetaan säännöllisesti 6-12 kk välein rokotevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kolirokote (+ klostridirokote) annetaan ensikoille 2 kertaa n. 3 ja n. 6 viikkoa ennen porsimista ja emakoille n. 3 viikkoa ennen porsimista rokotevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Sikavan erityistasolla olevassa sikalassa ei saa käyttää Cl. perfringens tyyppi C:tä vastaan rokotetta.

Sikavan kansallisella tai erityistasolla olevassa sikalassa ei saa käyttää porsasyskää tai aivastustautia vastaan rokotetta.